

Lipofilling

De behandeling

Op de (poliklinische) operatiekamer aangekomen zal de plastisch chirurg voor de operatie het te behandelen gebied, aftekenen. De Plastisch chirurg kan door middel van deze tekening een nauwkeurige inschatting maken waar en hoeveel vet er ingespoten dient te worden. Een lipofilling kan plaats vinden onder plaatselijke verdoving en onder narcose. De tijdsduur van de behandeling is afhankelijk van de uitgebreidheid van het te behandelen gebied.

Op de behandelkamer wordt met dunne buisjes vet weggezogen. Het vetweefsel wordt vervolgens geïnjecteerd op de gewenste plaats. Na de ingreep worden de wondjes gehecht. Hierop komen kleine hechtpleisters.

Na de behandeling

Na de ingreep kunt u een beurs gevoel hebben, dit verdwijnt vanzelf. Douchen mag 48 uur na de ingreep. Sporten mag u, afhankelijk van de uitgebreidheid van de operatie en de locatie, na 2 tot 4 weken.

Risico's en complicaties

U wordt uiteraard naar beste kunnen behandeld, maar bij elke operatie is er een kans op complicaties zoals: allergische reactie op gebruikte verdovingsvloeistoffen of materialen, bloeduitstorting, nabloeding, infectie, het ontstaan van een hypertrofisch litteken en trombose. Deze complicaties komen echter zelden voor. Specifieke complicaties na een lipofilling kunnen zijn: zwellingen ter hoogte van de inspuiting, gestoorde wondgenezing, beschadiging van een zenuwtakje wat kan resulteren in gevoelloze plekjes en een onregelmatig huidoppervlak. Soms is het nodig de behandeling te herhalen, als een deel van het ingespoten vetweefsel door uw lichaam wordt afgebroken. Deze risico's en complicaties, evenals het belang van het stoppen met roken zijn tijdens het consult met u besproken. Hoewel de operatie met de grootste zorg zal worden uitgevoerd, maar het genezingsproces per individu verschilt, is het voor ons niet mogelijk om garanties te geven.

Ter voorbereiding

Hieronder volgen enkele adviezen ter voorbereiding:

- Het is van belang dat u tijdig stopt met het innemen van uw medicijnen, indien nodig. U heeft dit met de plastisch chirurg besproken.
- Bij pijn kunt u paracetamol slikken, sommige pijn bestrijdende middelen geven een bloedverdunding.
- Vitamine C 1000 mg helpt bij een goede wondgenezing. Wij adviseren hier twee weken voor de operatie mee te starten en door te gaan tot een week na de operatie.
- Wij adviseren u, zodra de operatie gepland is, te stoppen met roken, omdat dit enorm bevorderend kan zijn voor het genezingsproces.

- Wij raden u aan 24 uur voor tot 24 uur na de ingreep geen alcohol te drinken.
- Autorijden wordt absoluut door ons afgeraden. Laat u zich op de dag van behandeling dus door iemand wegbrengen en ophalen.

Na de operatie

- Twee weken niet sporten.
- U krijgt een afspraak mee voor een poliklinische controle. De hechtingen worden 12 á 14 dagen na de operatie verwijderd.

Tot slot

Indien u vragen heeft na het lezen van de folder of na de ingreep, kunt u contact opnemen met de polikliniek Plastische Chirurgie. Bij nood, buiten contacturen, kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp.

De polikliniek Plastische Chirurgie is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 346 28 04**.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat ons dit dan weten.

© HagaZiekenhuis Zoetermeer

April 2020/versie 3/Plastische Chirurgie