



## Hystero-Salpingografie (HSG)

### **Belangrijk!!!!**

Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Het röntgenonderzoek **moet** worden uitgevoerd **na** de menstruatie en **voor** de volgende eisprong.

**Neem uw partner of een begeleider mee.**

### **Inleiding**

Uw gynaecoloog heeft voor u een röntgenonderzoek van uw baarmoeder en eileiders aangevraagd (Hystero-Salpingografie). In deze folder leest u meer over de wijze waarop het onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u die altijd stellen aan uw gynaecoloog of aan de radiologisch laborant.

### **Vorbereiding**

Het inspuiten van contrastmiddel in de baarmoeder kan pijn veroorzaken. Om hier minder last van te hebben, adviseren wij u om, een half uur voor het onderzoek, een pijnstiller (bijvoorbeeld naproxen) in te nemen.

### **Het onderzoek**

U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de afdeling Radiologie. Als u aan de beurt bent, komt een laborant u in de wachtkamer halen. Voor dit onderzoek dient u het onderlichaam te ontbloten. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van röntgenstralen. Van deze stralen merkt u tijdens het onderzoek niets. Het risico van deze stralen is verwaarloosbaar klein.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gynaecoloog. U neemt plaats op de onderzoekstafel, met uw benen in de beensteunen. De gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in de schede. Vervolgens wordt de baarmoedermond gedesinfecteerd. Dit geeft een koud gevoel. In de baarmoedermond wordt een cup geplaatst. Het contrastmiddel wordt in de baarmoeder gespoten. Dit kan pijn veroorzaken. Het inbrengen van het contrastmiddel wordt met behulp van röntgendoorlichting gevolgd op de monitor.

De laborant maakt een aantal foto's. Het onderzoek is daarna klaar. De gynaecoloog bespreekt direct met u het onderzoek en het voorlopige resultaat.

### **Duur van het onderzoek**

De duur van het onderzoek zal ongeveer 15 minuten zijn.



**LangeLand**  
*beter dichtbij*

# Patiënteninformatie

## **Na het onderzoek**

Het contrastmiddel wordt door het buikvlies opgenomen en door het lichaam afgebroken en uitgescheiden. U krijgt een maandverband van de laborant, om eventueel vaginaal lekkend contrastmiddel en bloed op te vangen. U kunt de afdeling direct verlaten. Het is mogelijk dat u de rest van de dag nog wat last heeft van een weeïge pijn. Na het onderzoek zal een radioloog de foto's beoordelen en zijn bevindingen doorgeven aan uw gynaecoloog.

Eventueel dient er na 24 uur nog een foto gemaakt te worden. Dit hoort u van de gynaecoloog.

## **Tot slot**

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 346 25 20**.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via: [radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl](mailto:radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl).