



Vacuümbiopt van de borst

Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling Radiologie van het Lange Land ziekenhuis, route nr. 8.

U heeft een afspraak op:

..... om.....uur

Inleiding

U heeft binnenkort een afspraak voor het afnemen van een vacuümbiopt op de afdeling Radiologie. In deze folder leest u meer over dit onderzoek. Deze folder komt niet in plaats van een gesprek met uw arts. De arts/of verpleegkundige is altijd bereid om u een en ander uit te leggen.

Doel van het onderzoek

Een vacuümbiopt is een onderzoek waarmee een klein stukje weefsel uit de borst wordt weggehaald met begeleiding van de röntgenfoto's.

U wordt plaatselijk verdoofd, zodat u tijdens het onderzoek zo min mogelijk pijn ervaart. Geheel pijnloos is het onderzoek niet.

Duur van het onderzoek.

Het onderzoek duurt ongeveer 60 minuten.

Het onderzoek

Tijdens het onderzoek is er steeds een laborante aanwezig. Zij zal u uitleg geven over de handelingen tijdens het onderzoek en zij beantwoordt al uw vragen.

De procedure kan zowel zittend als liggend worden uitgevoerd, dit is afhankelijk van de plaats van de afwijking die aangeprikt moet worden. Eerst worden opnieuw foto's gemaakt om de exacte plaats van de afwijking te bepalen. Tijdens het onderzoek blijft uw borst beklemd tussen de röntgenplaten.

Er wordt steriel gewerkt en de huid wordt ontsmet. U krijgt een verdoving in de huid ingespoten. De radioloog maakt daarna een kleine snede in de huid. De naald wordt hier doorheen geplaatst. Deze naald zit vast aan een vacuümsysteem. Dit systeem maakt tijdens de hele procedure een brommend geluid. Er worden meerdere biopten genomen, die daarna worden gefotografeerd om te controleren of de afwijking in de biopten aanwezig is.

Na de bioptie wordt er een marker achtergelaten op de plaats van de bioptie. Deze marker is enkele maanden zichtbaar op de echografie en altijd zichtbaar op de röntgenfoto's.

Na het onderzoek

Het wondje wordt afgeplakt met kleine pleisterstrips. Deze strips moeten drie dagen blijven zitten. Daarna mag u deze zelf verwijderen. Over de pleisterstrips heen wordt een tweede verband pleister geplakt. Deze mag u zelf eventueel na 48 uur verschonen.

Het is raadzaam **een goed steunende bh, zonder beugels mee te nemen** naar het onderzoek. Deze bh
© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer

moet u (tenminste) de eerste 24 uur dragen (dag en nacht). Dit zorgt voor minder pijn en verlaagd het risico op een nabloeding.

Waarschijnlijk zal er een bloeduitstorting ontstaan in de borst. Nadat de verdoving is uitgewerkt kan de borst gevoelig zijn. U mag paracetamol als pijnstillers gebruiken, maximaal 4 x per dag twee tabletten van 500mg. Liever geen asperine want dit werk deels bloedverdunnend.

Verder informatie over de nazorg krijgt u van de radiodiagnostisch laboranten welke bij het onderzoek aanwezig is.

Uitslag

De radioloog zal het beloop van het onderzoek schriftelijk meedelen aan uw behandelend chirurg. De patholoog zal de afgenomen bipten/weefsel onderzoeken en ook deze uitslag schriftelijk doorgeven aan uw behandelend chirurg. Dit onderzoek neemt enkele dagen in beslag.

Ongeveer 4 werkdagen na het onderzoek heeft u een afspraak bij uw behandelend chirurg. Deze zal de uitslagen met u bespreken.

Bloedverduunners/Allergie:

Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt en/of allergisch bent voor bepaalde medicatie, meldt dit dan aan de arts die u verwijst. Die kan u adviseren tijdelijk met de bloedverdunnende medicijnen te stoppen om een bloeding tijdens of na de biopt te voorkomen en/of rekening houden met uw allergie.

Bij gebruik van Ascal (carbasalaatcalcium) dient 5 dagen voor het onderzoek te worden gestopt.

Bij gebruik van acenocoumarol (Sintrom Mitis®) en fenprocoumon (Marcoumar®) dient 1 dag voor het onderzoek bloedafname plaats te vinden, om de INR (stollingstijd) te controleren.

Vragen

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de mammacare verpleegkundige Els Bekink en/of Andrea Wijnen (079) 346 28 14.

Tot slot

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer of via info@llz.nl.