



Beenmergpunctie

Inleiding

Uw arts heeft voor u een beenmergpunctie aangevraagd. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het betreffende onderzoek zal worden uitgevoerd. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u die altijd stellen aan uw arts.

Wat is een beenmergpunctie?

Een beenmergpunctie wordt ook wel botboring of crista biopsie genoemd. Er wordt dan met een naald geprikt op een plek in de bekkenrand. Dit stuk bot bevindt zich achter op uw bekken en wordt ook wel zitbeen genoemd. Dus, als u rechtop in een stoel tegen de leuning aan gaat zitten dan komt u eigenlijk met dat stuk bot tegen de leuning aan.

In dat bot worden, overigens net als in de meeste andere botten, veel bloedcellen gemaakt voordat zij in de bloedbaan terecht komen. Het gaat vooral om de rode bloedcellen, de witte bloedcellen en de bloedplaatjes. Sommige ziekten ontstaan doordat er in dat beenmerg iets niet goed werkt. Uw arts kan daarin geïnteresseerd zijn en zal dan een beenmergpunctie aanvragen. Het onderzoek vindt plaats op de dagbehandeling.

De procedure zelf

Tijdens het onderzoek ligt u in zijligging op de onderzoeksbank of op een bed. Uw benen dient u zoveel mogelijk op te trekken zoals op de illustratie is te zien. De arts bepaalt waar u geprikt zult worden en zal de plaats van prikken verdoven. De huid en de spieren kunnen verdoofd worden, het bot zelf niet. Na de verdoving zal de arts prikken. U kunt op dat moment enige pijn hebben in één been. Dat gaat na de ingreep vanzelf voorbij. Als de naald diep genoeg zit zal de arts wat bloed uit het bot opzuigen met een injectiespuit. Dit kan een pijscheut tot gevolg hebben, maar kan soms ook pijnloos verlopen, dat is niet van tevoren te voorspellen. Wel zal de arts u waarschuwen wanneer er mogelijk een pijscheut kan komen. Nadat er wat bloed met beenmergcellen is afgenomen zal de arts vaak nog via dezelfde naald een miniscuul pijpje botweefsel eruit halen.

Na de ingreep, die vaak niet langer dan enkele minuten duurt, zal de naald verwijderd worden en zal de prikplaats afgedekt worden met een pleister. Daarna zult u verzocht worden om nog even op uw rug te blijven liggen. Daarna kunt u op eigen gelegenheid naar huis. De pleister kunt u de volgende dag verwijderen. Het kan zijn dat als u diezelfde dag rechtop op een stoel zit met uw rug tegen de leuning dat het dan nog een beetje gevoelig aanvoelt. Dit is echter niet de verwachting.



LangeLand
beter dichtbij

Patiënteninformatie

Illustratie: op deze figuur is te zien op welke plaats ongeveer de arts zal prikken.

