



Injectie medicatie gewricht met behulp van echo

Inleiding

Uw arts heeft voor u een injectie medicatie aangevraagd. De medicatie kan ingebracht worden in of rondom een gewricht of rondom pezen. De werking van het medicijn en/of verdoving is hierbij het belangrijkste doel. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Voor dit onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel. Mocht u allergisch zijn voor jodium, neemt u dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 079 – 346.25.20.

Vorbereiding

U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. U hoeft ook **niet nuchter** te zijn.

Het onderzoek

Injectie medicatie/ verdoving met behulp van echo

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie.

Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u ophalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog en radiologisch laborant.

De radioloog zal met behulp van een echoapparaat de plaats van de injectie bepalen. Hierbij wordt steriel gewerkt. Via de injectienaald worden al naar gelang het gevraagde onderzoek verschillende stoffen in het gewricht gebracht. Dit kan zijn: Een verdovingsmiddel, medicijnen of een combinatie hiervan.

Duur van het onderzoek

In het algemeen zal dit ongeveer 10 minuten duren.

Na het onderzoek

Wij adviseren u het onderzochte gewricht de komende 24 uur te ontzien. Een normale, niet intensieve belasting kan geen kwaad. U mag na een injectie in een gewricht **geen voertuig besturen** omdat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij een ongeval kort nadat er een verdoving, medicijn of contrastmiddel in een gewricht is ingebracht. Zorg dus dat u niet zelf hoeft terug te rijden.

Het verdovingsmiddel en eventuele toegediende contrastmiddel worden door het lichaam opgenomen en zijn na 24 uur weer uit het gewricht/ lichaamsdeel verdwenen. Medicijnen die in gewrichten worden ingebracht hebben doorgaans een veel langere werking. Complicaties bij dit onderzoek zijn zeer zeldzaam. Als er echter toch ongewone verschijnselen optreden zoals pijn, een opgezwollen, rood of warm gewricht of een verlamd gevoel dient u binnen kantooruren contact op te nemen met uw behandelend arts (bv de orthopeed) via de poli Orthopedie, telefoonnummer: (079) 346 25 35.

Bij complicaties **buiten kantooruren** kunt u contact op nemen met de Spoed Eisende Hulp via telefoonnummer: (079) 346 25 39.



LangeLand
beter dichtbij

Patiënteninformatie

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 346 25 20**.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit ons dan weten via het volgende emailadres:
radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl.