

Injectie met Kenacort

Op advies van uw behandelend reumatoloog krijgt u een injectie met Kenacort. Deze folder geeft u informatie over dit geneesmiddel. Heeft u na het lezen nog vragen, dan kunt u daarmee altijd terecht bij uw reumatoloog.

Werking

Kenacort valt onder de glucocorticoïden. Dit medicijn staat bekend om de ontstekingsremmende werking. Het helpt om zwellingen, stijfheid, pijn en andere ontstekingsverschijnselen te laten verdwijnen of in ieder geval te verminderen.

U zult vaak al binnen een dag merken dat de klachten verminderen. Het kan wel enige tijd duren voor het medicijn optimaal werkt. Kenacort kan enkele weken tot soms wel maanden effect hebben.

Wanneer gebruiken?

U kunt een injectie met Kenacort krijgen als:

- U een ontsteking heeft van een gewricht, peesschede of slijmbeurs;
- U een reumatische ziekte heeft met een actieve ontsteking en de andere anti-reumatische medicijnen (nog) niet werken;
- U een reumatische ziekte heeft en er plotseling een reumatische ontsteking optreedt.

Toedienen van de injectie

We kunnen de injectie met Kenacort op twee manieren aan u geven:

- Een plaatselijke injectie in een gewricht (intra-articulair), in een slijmbeurs of bij een pees of peesaanhechting;
- Een injectie in de bilspier (intramusculair). Deze zullen we toedienen als er sprake is van ontstekingen in meerdere gewrichten.

De dosering per injectie hangt af van de ernst van de klachten en de plaats van de injectie. Soms voegen we de stof lidocaïne toe aan de injectie. Lidocaïne heeft een verdovende werking. De stof verdooft tijdelijk de plek waar de injectie plaatsvindt en het weefsel hieromheen. De verdoving werkt al na enkele minuten en houdt twee tot drie uur aan.

Rust

Heeft u een injectie in een gewricht gekregen? Dan vragen we u om het geïnjecteerde gewricht minimaal 48 uur zo weinig mogelijk te gebruiken. Dit bevordert namelijk de werking van het medicijn. Neem contact op met uw behandelend reumatoloog wanneer u last krijgt van koorts na het toedienen van de injectie.

Mogelijke bijwerkingen

De kans op bijwerkingen bij het kortdurend gebruik van Kenacort is zeer klein. Bijwerkingen als botontkalking, huidproblemen, gewichtstoename, volle maan gezicht etc. komen bijna nooit voor, omdat we Kenacort slechts tijdens een beperkte periode toedienen. Ook zullen we u niet vaak een injectie geven en doen we dit telkens maar op één plek.

U moet wel rekening houden met de volgende mogelijke bijwerkingen:

- Tijdelijke stijging van de bloedsuikerspiegel bij patiënten met diabetes;
- Plaatselijke blauwe plek of bloeding bij patiënten die bloedverduunners gebruiken;
- Pijn, roodheid op de injectieplaats en plaatselijke veranderingen in de huid als een kuiltje of verkleuring van de huid;
- Soort ‘opvliegers’ die één tot drie dagen aanhouden en zich uiten in een rood gezicht en gejaagdheid.

Deze bijwerkingen komen zelden voor:

- Koorts en hartkloppingen;
- Menstruatiestoornissen: uitblijven van de menstruatie, tijdelijk veranderen van de menstruatie of bloedverlies bij vrouwen die al in de overgang zijn geweest;
- Infecties.

Zwangerschap en borstvoeding

Overleg even vooraf met de reumatoloog als u zwanger bent of borstvoeding geeft. De reumatoloog zal dan met u bespreken of het toedienen van de injectie verantwoord is.

Meer informatie

Onafhankelijke informatie over geneesmiddelen kunt u vinden op de volgende websites:

www.farmacotherapeutischkompas.nl en op www.apotheek.nl.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Reumatologie. Dat kan op werkdagen van 08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer 079-3462894.

Ook via de *BeterDichtbij App* is de polikliniek goed bereikbaar. Informeer hiernaar bij de assistente of de verpleegkundig reumaconsulente.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over uw behandeling, laat dit ons weten via bovenstaand telefoonnummer van de polikliniek Reumatologie of via communicatie@hagaziekenhuis.nl.